

Amt für Wald des Kantons Bern		Vereinfachter Standortschlüssel		
Titel: Ökogramm: Kolline und submontane Stufe (sm)				
Waldabteilung: ---	Revier: ---	Ablage: Register 3	Datum: 30.01.2002	
Ersetzt			vom:	

Zusammenfassung von Standorteinheiten (+Angabe minimaler Lbh- und Ta-Anteil für standortgerechte BA-Mischungen)

sehr trocken	Sehr trockene Föhren- und Eichenwälder (39a, 41, 65, 68)		Wechsellrockene Föhren- und Eichenwälder (39w, 61, 62)	Ahorn-Linden-Hangschuttwälder (sm) (25*, 25 ^{sf6})	Wintergrün-Föhrenwälder (sm) (66)
trocken	Stark saure, frische bis trockene Buchenwälder (sm) (1a, 1f, 2 ^{ha} , 2 ^{hk}) Lbh > 40%	Trockene Laubwälder (14a, 14e, 15a, 16a, 25, 35) Lbh > 50%	Wechsellrockene Buchenwälder (sm) (14w, 15w, 16w) Lbh > 40%	Buchenwälder mit Steinschlag (sm) (13a, 13e) Lbh > 60%	
frisch		FrISCHE, basenarme Buchenwälder (sm) (6, 7a, 7a ^a , 7a _B , 7a _L) Lbh > 60%	FrISCHE, basenreiche Buchenwälder (sm) (7e, 7f, 9a, 9a ^u , 10a) Lbh > 60%		Hartholzauenwälder (sm) (28 ^(ex) , 29a ^(ex) , 29e ^(ex)) Lbh > 80%
feucht	Stark saure Buchenwälder mit Rippenfarn (sm) (7*) Lbh > 20%	Feuchte, basenarme Buchenwälder (sm) (7b) Lbh > 50%	Feuchte basenreiche Buchenwälder (sm) (7g, 7s, 11, 11 _A) Lbh > 60%	Eiben-Buchenwald (sm) (17, 17c) Lbh > 50%	
nass	Peitschenmoos Fichten-Tannenwälder (46a ^u , 46g ^u , 46s ^u) Ta > 40% ¹ Lbh > 10%	Ahorn-Eschenwälder (sm) (26a, 26f, 26g, 26 ^g) Lbh > 60%			Ahorn-Eschenwälder (sm) (26w)
		Bacheschenwälder (sm) (27a, 27f, 27g, 30) Lbh > 80%		Bacheschenwälder (sm) (27w)	
sehr nass	Birkenbruchwald (sm) (45)	Erlenbruchwälder (44) Lbh > 80%			
	sauer	basisch	wechselnde Wasser- verhältnisse	Schutt	Auen- gesellschaften

Standortheimische Baumarten (grauer Hintergrund = Pflanzung nicht empfohlen)

sehr trocken	TEi, Fö, Mebe, FAh, Es, Li, Els, Birne, Apfel, Spei, Vobe, Fi		TEi, Fö, Mebe, FAh, Li, BAh, Birke, Apfel, Spei, Els, Eib	Li, Es, BAh, SAh, BUI, Mebe, TEi, FAh	Fö, Fi
trocken		Bu, Fö, Mebe, TEi, Els, Birne, Spei, FAh, Li, BAh, SAh, BUI, Es, Ki, Hbu, Eib, SbiAh ² , Nu		Bu, BAh, Li, SAh, Nu, Es, BUI, TEi, Mebe	
frisch	Bu, TEi, Fö, WLi, Hbu, Bi, Els, Eib	Bu, TEi, Ki, BAh, WLi, Hbu, SEi, Es	Bu, Fö, Mebe, TEi, Els, FAh, Li, Ki, BAh, Es, Hbu		Bu, BAh, Es, Ki, SAh, Li, BUI, Els, Fö, TEi, Mebe, FAh, FIUI
feucht	Bu, Ta, SEi, Fi, Fö, Bi	Bu, SEi, Ta, Es, BAh, Ki, WLi, Hbu, TEi	Bu, Es, BAh, SAh, BUI, SEi, Ki	BAh, Es, Li, BUI	
nass	Ta, Fi, SEi, Vobe	Es, BAh, SEi, BUI, SAh, Ki, SEr			Es, SEr, SEi, BAh
sehr nass	MBi, HBi, Fö	SEr			
	sauer	basisch	wechselnde Wasser- verhältnisse	Schutt	Auen- gesellschaften

¹ Falls im Ausgangsbestand Ta-Samenbäume fehlen, muss in der ersten Folgegeneration nur ein Ta-Anteil von 10% erreicht werden.

² Der Schneeballblättrige Ahorn wird nur am Jurasüdfuss empfohlen.



Amt für Wald des Kantons Bern		Vereinfachter Standortschlüssel		
Titel: Ökogramm: Untermontane Stufe (um)				
Waldabteilung: ---	Revier: ---	Ablage: Register 3	Datum: 30.01.2002	
			vom: Ersetzt	

Zusammenfassung von Standorteinheiten (+Angabe minimaler Lbh- und Ta-Anteil für standortgerechte BA-Mischungen)

sehr trocken	Sehr trockene Föhrenwälder (um) (65, 68)		Wechsellückwälder Föhrenwälder (um) (61, 62)	Ahorn-Linden-Hangschuttwälder (um) (25*, 25* ^{fb})	Wintergrün-Föhrenwälder (um) (66)	
trocken	Sehr trockene bis trockene, stark saure Buchenwälder (1a ^{ho} , 2 ^{ho}) Lbh > 40%	Trockene Buchenwälder (um) (12e, 15a, 16a) Lbh > 50%	Wechsellückwälder Buchenwälder (um) (12w, 15w, 16w) Lbh > 40%	Buchenwälder mit Steinschlag (um) (13a, 13e) Lbh > 60%		
frisch		Frische, basenarme Buchenwälder (um) (8a, 8d) Lbh > 50%			Frische, basenreiche Buchenwälder (um) (8e, 8f, 12a, 12a ^{bl} , 12c) Lbh > 50%	
feucht	Stark saure Buchenwälder mit Rippenfarn (um) (8*) Lbh > 20%	Feuchte, basenarme Buchenwälder (um) (8b) Lbh > 50%	Eiben-Buchenwald (um) (17, 17c) Lbh > 50%	Buchenwald auf Alluvionen (12a ^{all}) Lbh > 50%	Hartholzauenwälder (um) (28 ^(ex) , 29a ^(ex) , 29e ^(ex)) Lbh > 80%	
nass	Heidelbeer Fichten-Tannenwälder (um) (46a, 46e, 46g, 46s) Ta > 40% ¹ Lbh > 10%	Ahorn-Eschenwälder (um) (26a, 26f, 26g, 29 ^b) Lbh > 60%		Ahorn-Eschenwälder (um) (26w)	Reitgras-Grauerlenwälder (um) (32)	
sehr nass		Birkenbruchwald (um) (45)	Bacheschen- und Traubenkirschen-Eschenwälder (um) (27a, 27f, 27g, 30) Lbh > 80%			Bacheschenwälder (um) (27w)
	sauer	basisch		wechselnde Wasser-verhältnisse	Schutt	Auen-gesellschaften

Standortheimische Baumarten (grauer Hintergrund = Pflanzung nicht empfohlen)

sehr trocken	Fö, Mebe, Es, Vobe, Fi		Fö, Mebe, BAh, Es, Els	Li, Es, BAh, BUI, Mebe, TEI, FAh	Fö, Fi	
trocken	Bu, Ta, Fö, Fi, Bi,	Bu, Fö, Mebe, TEI, Els, Li, BAh, Ki, Es	Bu, Fö, Mebe, TEI, Els, Ki, BAh, Es, Eib	Bu, BAh, Li, Es, BUI, Mebe		
frisch		Bu, Ta, Ki, BAh, Es			Bu, BAh, Ki, BUI, Es, Ta, Eib, Els	
feucht	Bu, Ta, Fi, Fö	Bu, Ta, BAh, Es	Bu, Es, BAh, Ki, BUI, Mebe, Ta, Eib	Bu, BAh, Es, Fi, BUI, Mebe	Es, BAh, BUI, Ki, SEr	
nass	Ta, Fi, Bu, Vobe	Es, BAh, BUI, Ki, SEi		BAh, Li, BUI, Es	GEr, Fi, BAh, Wei	
sehr nass		Es, SEr, BAh	Es, SEr, BAh			
	sauer	basisch		wechselnde Wasser-verhältnisse	Schutt	Auen-gesellschaften

¹ Falls im Ausgangsbestand Ta-Samenbäume fehlen, muss in der ersten Folgegeneration nur ein Ta-anteil von 10% erreicht werden

Amt für Wald des Kantons Bern			Vereinfachter Standortschlüssel	
Titel: Ökogramm: Obermontane Stufe (om)				
Waldabteilung: ---	Revier: ---	Ablage: Register 3	Datum: 30.01.2002	
			vom:	
Ersetzt				

Zusammenfassung von Standorteinheiten (+Angabe minimaler Lbh- und Ta-Anteil für standortgerechte BA-Mischungen)

sehr trocken		Sehr trockene Föhrenwälder (om) (65, 67)		Wechsellrockene Föhrenwälder (om) (61, 62, 63)	Mehlbeer-Ahornwald (om) (23)		
	Wachtelweizen-Fichtenwald (om) (54*)	Trockene Fichtenwälder (om) (53e) Lbh eingesprengt					
trocken	Stark saure Buchen- und Tannen-Buchenwälder (2 ^{ho} , 19, 19 ^{ka} , 19 ^{ps}) Lbh > 20% Ta > 30% ¹	FrISChe, basenarme Tannen-Buchenwälder (18a, 18a _F , 18d, 18a ^{bl}) Lbh > 20% Ta > 30% ¹	FrISChe, basenreiche Tannen-Buchenwälder (18e, 18f) Lbh > 20% Ta > 30% ¹	Wechsel-trockene Fichtenwälder (om) (53a) Lbh eingesprengt	Block-schutt-Fichtenwälder (om) (48a, 48e)	Alpen-dost-Buchenwald (13 ^{ho}) Lbh > 50%	Reitgras-Grauerlenwälder (om) (32)
mässig trocken							
frisch				Wechselfeuchte (Tannen)-Buchenwälder (17, 17c, 18w) Lbh > 30% Ta > 20% ¹	Ahorn-Hangschuttwälder (om) (22a, 22s, 22*, 24* ^u)		
feucht	Heidelbeer-Fichten-Tannenwälder (om) (46a, 46e, 46g, 46s) Lbh eingesprengt Ta > 40% ¹	Feuchte, basenarme Tannen-Buchenwälder (18s) Lbh > 20% Ta > 30% ¹	Feuchte, basenreiche Tannen-Buchenwälder (18s _E , 20a, 20ap, 20g) Lbh > 20% Ta > 30% ¹				
nass	Torfmoos Nadelwälder (om) (56, 71)	Ahorn-Eschenwald mit Alpen-dost Lbh>50% (26 ^{ho})		Wechselnasse Laubwälder (26w, 27w, 32*)			
sehr nass		Schachtelhalm Tannenmischwald (om) (49a) Lbh eingesprengt Ta > 30% ¹	Nasse Tannen- und Eschenwälder (27 ^{ho} , 49f) Lbh > 50%				
	sauer	basisch		wechselnde Wasser-verhältnisse	Schutt	Auen-gesellschaften	

Standortheimische Baumarten (grauer Hintergrund = Pflanzung nicht empfohlen)

sehr trocken		Fö, BFö, Mebe		Fö, Mebe, BAh	BAh, Mebe, Es, BUI		
	Fi, Vobe	Fi, BAh, Ta, Mebe, Vobe, Fö, BFö					
trocken							
mässig trocken	Bu, Ta, Fi, Vobe	Bu, Ta, Fi, BAh	Bu, Ta, BAh, BUI, Ki, Fi, Fö, Mebe	Fi, BAh, Ta, Mebe, Vobe, BFö	Fi, Ta, Bu, BAh, Vobe	Bu. Bah. Li, BUI Ta	G ^{Er} , Fi, BAh, Wei
frisch							
feucht	Ta, Fi, Vobe	Bu, Ta, BAh, Fi	Ta, Bu, BAh, BUI, Fi	Bu, BAh, Ta, Mebe, Es, Ki, Eib	BAh, Es, BUI, Fi, Ta		
nass		BAh, Es, Ta, BUI		BAh, Es, G ^{Er} , Fi, Wei			
sehr nass	BFö, Fi	Ta, Fi, BAh	Es, Ta, BAh				
	sauer	basisch		wechselnde Wasser-verhältnisse	Schutt	Auen-gesellschaften	

¹ Falls im Ausgangsbestand Ta-Samenbäume fehlen, muss in der ersten Folgegeneration nur ein Ta-Anteil von 10% erreicht werden.

Amt für Wald des Kantons Bern			Vereinfachter Standortsschlüssel	
Titel: Ökogramm: Hochmontane Stufe (hm)				
Waldabteilung: ---	Revier: ---	Ablage: Register 3	Datum: 30.01.2002	
			vom:	
Ersetzt				

Zusammenfassung von Standorteinheiten (+Angabe minimaler Lbh- und Ta-Anteil für standortgerechte BA-Mischungen)

sehr trocken	Wachtelweizen-Fichtenwald (hm) (54*)	Sehr trockene Föhrenwälder (65, 67)		Wechsellöcher. Bergföhrenwald (63)	Wechsellöcherer Fichtenwald (hm) (53a)	Mehlbeer-Ahornwald (hm) (23)	Blockschutt Fichtenwälder (hm) (48a, 48e)
		Trockene Fichtenwälder (hm) (53e) Lbh eingesprengt					
trocken	Heidelbeer-Fichten-Tannenwälder (hm) (46a, 46e, 46g, 46s) Ta > 30%	Frische, saure Tannen-Fichtenwälder (50d, 51, 55) Ta > 30% ¹	Karbonat Fichten-Tannenwald (50*) Lbh eingesprengt Ta > 30% ¹	Reitgras-Fichtenwald (hm) (60*) Lbh eingesprengt	(Ulmen-) Ahornwälder (hm) (22*, 24* _u)		
mässig trocken							
frisch		Schachtelhalm Tannenmischwald (49a) Lbh eingesprengt Ta > 40% ¹		Ahorn-Grauerlen-Pionierwald (32*)			
feucht		Torfmoos Nadelwälder (hm) (56, 71)					
nass							
sehr nass							
		sauer	basisch	wechselnde Wasser-verhältnisse	Schutt	Auen-gesellschaften	

Standortheimische Baumarten (grauer Hintergrund = Pflanzung nicht empfohlen)

sehr trocken	Fi, Vobe	BFö, Fö, Fi		BFö, Fö, Mebe	BAh, Mebe, BUI, Fi	Fi, Ta, Vobe
		Fi, Vobe, Mebe, Bah, BFö				
trocken	Fi, Ta, Vobe	Fi, Ta, Vobe	Ta, Fi, BAh, Vobe	Fi, Ta, BAh, Vobe, Mebe (Pflanzung nur in Schutzwäldern)	BAh, BUI, Ta	
mässig trocken						
frisch		Ta, Fi, BAh, Vobe		BAh, GER, Wei, Fi		
feucht		BFö, Fi, Vobe	Ta, Fi, BAh, Vobe			
nass						
sehr nass						
		sauer	basisch	wechselnde Wasser-verhältnisse	Schutt	Auen-gesellschaften

¹ Falls im Ausgangsbestand Ta-Samenbäume fehlen, muss in der ersten Folgegeneration nur ein Ta-Anteil von 10% erreicht werden.